

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Bulletin N°10

13 Mai 1981

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de l'ARDECHE et de la DROME

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Alertes : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83
ABONNEMENT ANNUEL : 70 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER et DU POIRIER - Les dernières pluies ont dépassé les 20 à 25 mm . Il est donc nécessaire de renouveler les traitements même sous la pluie si le délai de rattrapage du produit utilisé en stop ou en curatif arrive à expiration avant l'arrêt de la période pluvieuse .

Nouvelles sorties de taches prévues à la fin du mois .

CARPOCAPSE DES POMMES et DES POIRES - Le traitement déjà conseillé avec le diflubenzuron sera à renouveler 14 jours après son application, puis toutes les trois semaines dès que la végétation se ralentira .

Avec les autres produits (larvicides) la première application s'effectuera à partir du 20 Mai dans les régions de basse altitude et les vergers ayant subi des dégâts l'an dernier . Cette date pourra être retardée de quelques jours en fonction des températures réellement observées et du degré d'infestation du verger à protéger .

CARPOCAPSE DES PRUNES - Des captures sont réalisées (Vaucluse, Ardèche et Bouches-du-Rhône), un traitement est à prévoir à partir du 20 Mai dans les secteurs précoces de ces régions et les vergers de variétés tardives généralement très infestés et surtout si leur récolte s'annonce faible . On emploiera de préférence la phosalone (Azofène, Zolone) à 60 g de M.A./hl si les acariens sont à craindre .

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - Dans les situations précoces et moyennes il conviendra de traiter dès réception les pépinières et les jeunes arbres en formation .

On préférera pour cette intervention un produit à action ovicide et larvicide tel le fénitrothion (nombreuses spécialités) 50 g de M.A./hl, le méthidathion (Ultracide) 40 g de M.A./hl ou le mévinphos (nombreuses spécialités) 50 g de M.A./hl .

MOUCHE DE LA CERISE - On commencera la protection par un premier traitement à partir du :

- 16-17 Mai sur le littoral Varois, la basse vallée du Gapeau et la région de Solliès-Pont .
- 18-19 Mai en zone précoce : plaine du Vaucluse et du Nord des Alpilles (Bouches-du-Rhône) .
- 21-22 Mai en zone moyenne : bordure plaine ci-dessus : Taillades, Ilse-sur-Sorgue, Mazan, Aubignan, Violès, Uchaux, Mornas et Sénas, Mallemort, Salon .
- 24-25 Mai en zone tardive : coteaux des Monts de Vaucluse et entourant la chaîne de la Trévaresse (Bouches-du-Rhône) : Ansouis, Lacoste, Apt, Jocas, Villes-sur-Auzon, Maiaucène, Vaison-la-Romaine, Valréas, Pierrelatte et Vernègues, Pélissanne, St-Cannat, Rognes

On utilisera l'une des matières actives suivantes :

diméthoate (nombreuses spécialités) 30 g. M.A./hl - délai d'emploi 7 j. avant récolte .
fenthion (Lebaycid) 50 g M.A./hl - délai d'emploi 15 j. avant récolte .
malathion (nombreuses spécialités) 100 g M.A./hl - délai d'emploi 7 j. avant récolte .
formothion (Anthio fort) 50 g M.A./hl - délai d'emploi avant récolte 7 j.
oléoparathion (nombreuses spécialités) 20 g M.A./hl - délai d'emploi 15 j. avant récolte .
décaméthrine (Décis) 1,25 g M.A./hl - efficace seulement sur les adultes, pourra être utilisé dès réception en zones moyenne et tardive et renouvelé 15 jours après si nécessaire .

P.A.19

MONILIOSE et CYLINDROSPORIOSE DU CERISIER - En cas de pluie ou de forte humidité on interviendra avec benomyl (Benlate) ou méthylthiophanate (Pelt) .Il est conseillé d'arrêter tout traitement 8-10 jours avant récolte (résidus) .

ECLATEMENT DES CERISES - Maintenir d'abord une humidité régulière du sol .Les vergers enherbés seraient moins vulnérables .L'emploi du citowett à 0,100 l./hl en pulvérisation copieuse 10-12 jours avant récolte ou l'application de 150 g de sulfate de cuivre/hl au stade J (grossissement du fruit) a permis de réduire les fentes sur fruits .
Employer ces produits seuls .

V I G N E

MILDIOU - Des foyers primaires très limités ont été découverts en Camargue route de St-Gilles, en Corse à Borgo et Aléria .

En conséquence la protection doit commencer dans l'ensemble de la Camargue et jusqu'à Tarascon, en Crau, ainsi qu'en Corse sur le littoral oriental .

Ailleurs, aucun foyer n'ayant encore été découvert on peut retarder le démarrage de la protection .

Par contre, les pluies des 10, 11, 12 Mai ont été suffisantes dans l'ensemble de la région pour provoquer des contaminations primaires, les premières taches pouvant alors être visibles à partir du 20 ou 25 Mai suivant les températures qui seront observées .

OIDIUM - Dans les zones précoces les premières attaques sont visibles sur Carignan .

BOTRYTIS - Quelques attaques sur feuilles en Ardèche, Var et Corse .L'intervention ne se justifie que lorsque le champignon atteint les grappes .

TORDEUSES DE LA GRAPPE - Les premières éclosions ont eu lieu dans les zones les plus précoces: vignoble oriental en Corse, littoral du Var au Bouches-du-Rhône, vignoble de Châteauneuf-du-Pape, région de Mazan .L'intervention en préventif ne se justifie pas en général .

On attendra la formation des glomérules pour juger de l'opportunité de traiter (seuil de 200 glomérules/100 grappes) .

Les premiers glomérules seront bien visibles vers le 20 Mai dans les zones précoces .

Ailleurs, attendre un prochain Bulletin .

ACARIENS ROUGES - Le seuil de 70 % de pousses habitées est atteint plus fréquemment que d'habitude dans le Vaucluse .

Attention à ne pas utiliser exagérément dans les programmes de traitement des pesticides favorisant les acariens : parathion, cuivre, pyréthrinoides .

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

DORYPHORE - Traiter les larves encore jeunes avec un des nombreux produits homologués à cet effet sur pomme de terre, tomate et aubergine si nécessaire .

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE
PROVENCE-ALPES-COTE d'AZUR & CORSE

G. TOUZAA